



CONVERSE COM SEU PEDIATRA SOBRE

Dra. Keli Both | Ginecologia e Obstetrícia
Cremers 31995/ RQE 23160 | @keli_both

Material informativo – não substitui a consulta médica - Versão 01

Cesariana eletiva
Banho precoce
Bater ou esfregar o bebê
Luz excessiva
Ar muito gelado
Separação dos pais
Colírio de forma indiscriminada
Aspiração de nariz e boca
Aspiração de ânus
Impedir o pele a pele real
Avaliar o bebê antes da Golden hour
Clampeamento imediato do cordão sem indicação
Aplicação de Vitamina K e vacina da hepatite B
Impedir ou forçar a amamentação na primeira hora
Prescrição indiscriminada de fórmula
Oferta de bicos sem autorização

TESTE DE TRIAGEM NEONATAL

Teste do Olhinho: até 72h de vida, repetido pelo pediatra 3x/ano nos primeiros 2 anos, consulta com oftalmopediatra aos 6 meses

Teste da Orelhinha: fonoaudióloga, entre 24-48h de vida

Teste da Linguinha: fonoaudióloga capacitada (atenção à qualidade do teste)

Teste do Coraçõzinho: enfermagem, entre 24-48h de vida

Teste do Pezinho: entre o terceiro e quinto dias de vida

Teste da bochechinha: não é obrigatório, mais de 300 doenças, avaliar antecedente familiar

Mostrar os resultados ao pediatra o mais breve possível, consultar em 7 dias, ou conforme orientação.

CUIDADOS COM RN:

Primeiro banho após as 24h (exceto HIV+)

Temperatura entre 37 e 37,5o C

Imersão (cuidado com a troca de água) ou chuveiro

Banhos diários (quantos forem necessários, sabonete apenas 1x dia) ou 2 a 3 x na semana

Produtos de higiene: sabonete líquido, pH 5,5, sem perfumes ou conservantes, hidratante, pomada para assaduras, óleos, lenço umedecido

Umbigo: limpar muito bem a cada troca, usando álcool se necessário, mas com água e sabão é suficiente, tirar toda secreção acumulada na junção com a pele, é comum sangrar um pouco, pode continuar limpando.